

Varón de 67 años que acude por Dolor en codo

## ANTECEDENTES PERSONALES:

No alergias medicamentosas conocidas.

HTA.

Artritis psoriásica.

Picadura de abeja en cara en 1999 aprox. con gran componente inflamatorio alérgico local y prurito generalizado. No valorado por Alergología.

Varices EEII.

IQ: Prótesis codo.

Tto habitual: Airtal. Cozaar plus. Metotrexate. Acfol.

## ENFERMEDAD ACTUAL:

Refiere sensación de "click" sin traumatismo importante en antebrazo izquierdo el lunes por la noche. Desde entonces dolor e impotencia funcional en dicha extremidad.

## EXPLORACION GENERAL:

Dolor a la palpación de cubito proximal izquierdo. Movilidad limitada por dolor pero posible. Nv ok. Lesión del nv interóseo posterior postquirúrgica

## PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

RX CODO IZQ:

Fractura periprotésica cubito izq

## TRATAMIENTO RECIBIDO

**EN URGENCIAS:** Yeso

braquiopalmar

## JUICIO DIAGNOSTICO:

Fractura periprotésica cubito izq en paciente con prótesis de codo

## TRATAMIENTO DE ALTA:

Brazo en cabestrillo. Movilización frecuente de dedos.

Si dolor Nolotil 1-2 cápsulas cada 6-8 horas. Acudirá a

control en una semana a Consultas Externas de Traumatología, previa realización de Rx de control.

